



Pomme de Terre

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°14 du 25 juillet 2006 - 1 page

Mildiou

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX

Stations météo SRPV - FREDON - données au 24/07

Postes	Génération en cours	Date des dernières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies (mm) depuis le 17/07
77-Chevry Cossigny	10 ^{ème}	23/07	29/07	42
77-Villeroy	9 ^{ème}	23/07	29/07	17
78-Boissy Sans Avoir	9 ^{ème}	23/07	29/07	17.5
78-Poissy	8 ^{ème}	23/07	29/07	1

Stations météo France - données au 22/07

Postes	Génération en cours	Date des dernières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies (mm) depuis le 17/07
77-Changis sur Marne	7 ^{ème}	21/07	27/07	10.8
77-Chevru	7 ^{ème}	Pas de nouvelle contamination		9.4
77-La Brosse Montceaux	6 ^{ème}	Pas de nouvelle contamination		5.2
77-Nangis	8 ^{ème}	Pas de nouvelle contamination		9.8
77-Nemours	6 ^{ème}	Pas de nouvelle contamination		12.6
78-Trappes	6 ^{ème}	Pas de nouvelle contamination		19.2
91-Courdimanche	7 ^{ème}	Pas de nouvelle contamination		17.4
95-Cormeilles	10 ^{ème}	23/07	29/07	42
95-Wy dit joli village	8 ^{ème}	Pas de nouvelle contamination		19.2

Une dégradation orageuse est prévue pour le milieu de la semaine, maintenez vos parcelles protégées et réalisez l'application avant les pluies sur les parcelles arrivant en fin de protection.

Ravageurs

Pucerons

On observe une diminution de la population de puceron sur nos différentes parcelles d'observation.

Nouvelle méthode pour déclencher son traitement insecticide puceron :

Prélever une des deux folioles latérales jouxtant la foliole terminale.

Observer la présence de pucerons ou non et répéter l'opération 40 fois sur différentes plantes.

Un comptage de puceron par feuille est indispensable pour déclencher un traitement. Intervenez si plus de 20 folioles sur 40 sont porteuses de pucerons en privilégiant les traitements du matin compte tenu des fortes chaleurs.

Doryphores

On observe une diminution de la population de doryphores à l'exception de certaines parcelles comme à Chambry (77) où l'on note 75% de plantes avec larves et adultes et Villenauxe la Petite (77) où 35% des plantes abritent des larves et 60% des adultes.

Observez vos parcelles et intervenez en présence de larves de doryphores au stade grain de blé avec des pyrèthrinoïdes, carbamates ou endosulfan.



Direction Régionale et
Interdépartementale de
l'Agriculture et de la
Forêt
Service Régional de la
Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Ile de France

Imprimé à la station
D'Alertes
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
B. FERREIRA

D3 5° 2006-88-113

BnF
S&T

P15